

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
info@dhu.de



Spasmovetsan®-S

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml (5 g) enthält:

Wirkstoffe: Chelidonium Dil. D2 50 mg, Colocynthis Dil. D2 50 mg, Nux vomica Dil. D2 50 mg.

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den veterinär-homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, die mit krampfartigen Schmerzen (Spasmen) einhergehen
- Vermeidung von Verdauungsstörungen bei Futterumstellung, besonders bei Absatzferkeln sowie Koliken, Verstopfungen, Durchfälle aufgrund von Fütterungsschäden
- Pansenerschlaffung (Pansenatonie) und Pansenlähmung (sekundäre Pansenparese)
- Appetitmangel (Inappetenz)

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Anwendung.

Pferde:	10 – 15 ml	s.c.
Rinder:	10 – 15 ml	s.c.
Kälber:	5 – 10 ml	s.c.
Fohlen:	5 – 10 ml	s.c.
Schweine:	3 – 5 ml	s.c.
Schafe:	3 – 5 ml	s.c.
Ziegen:	3 – 5 ml	s.c.
Hunde:	1 – 2 ml	s.c.
Katzen:	1 – 2 ml	s.c.
Ferkel:	0,5 – 3 ml	s.c.
Welpen:	0,5 – 3 ml	s.c.

Zur einmaligen Behandlung, die nötigenfalls in Abständen von 1 bis 2 Tagen bzw. in sehr akuten Fällen nach 30 Minuten wiederholt werden kann.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

Hinweise für die richtige Anwendung

Subkutane Injektionen sollten von Tierhaltern erst nach entsprechender fachlicher Unterweisung durch den Tierarzt vorgenommen werden.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum von ca. 30 Minuten zu beobachten, um bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sofort den Tierarzt verständigen zu können.

Wartezeit

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege:	Essbare Gewebe:	0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege:	Milch:	0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise

Vor der Anwendung von Spasmovetsan®-S sollten die Erkrankung und ihre Ursachen tierärztlich abgeklärt sein. Die Anwendung ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, insbesondere bei

- Fieber
 - schweren Störungen des Allgemeinbefindens
 - sofortigem Erbrechen nach der Futter- oder Wasseraufnahme
 - fehlendem Kotabsatz
 - blutigem Erbrechen oder blutigem Kotabsatz
- sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden.

Anwendung während der Trächtigkeit und der Laktation

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von Spasmovetsan®-S aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Datum der Fassung der Packungsbeilage

März 2012

Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 20 Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6402744.00.00