

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
www.dhu.de



Formidium® ad usum vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder, Schweine (Ferkel),
Hunde, Katzen
Wirkstoff: Acidum formicicum D6

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml enthält:

Wirkstoff: Acidum formicicum Dil. D6 5 ml.

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem veterinär-homöopathischen Arzneimittelbild, dazu gehören:

- allergische Erkrankungen der Haut und Schleimhäute, z. B. Ekzeme
- Dämpfigkeit der Pferde (pulmonale Dämpfigkeit)
- Anaphrodisie (verminderter Geschlechtstrieb)
- zur unterstützenden Behandlung bei Ferkelruß, Euterpocken und entzündlichen Erkrankungen des Urogenitalapparates (Niere, Blase und Geschlechtsorgane)

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Keine bekannt.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schweine (Ferkel), Hunde und Katzen

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zur subkutanen Anwendung.

Pferd:	8 – 10 ml
Rind:	8 – 10 ml
Ferkel:	2 – 3 ml
Hund:	1 – 2 ml
Katze:	0,5 – 1 ml

Zur einmaligen Behandlung, die in Abständen von einer Woche wiederholt werden kann.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

Hinweise für die richtige Anwendung

Subkutane Injektionen sollten von Tierhaltern erst nach entsprechender fachlicher Unterweisung durch den Tierarzt vorgenommen werden.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum von ca. 30 Minuten zu beobachten, um bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sofort den Tierarzt verständigen zu können.

Wartezeit

Pferd, Rind, Schwein (Ferkel):	Essbare Gewebe:	0 Tage
Pferd, Rind:	Milch:	0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise

Vor der Anwendung von Formidium® ad usum vet. sollten die Erkrankungen und ihre Ursachen tierärztlich abgeklärt sein. Die Anwendung ersetzt nicht andere vom Tierarzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, insbesondere bei Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens, sollten Sie tierärztlichen Rat einholen.

Anwendung während der Trächtigkeit und der Laktation

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die gleichzeitige Gabe eines unverträglichen Arzneimittels, welches die Wirkung von Formidium® ad usum vet. aufheben könnte, ist zu vermeiden. Fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Datum der Fassung der Packungsbeilage

Juli 2007

Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 20 Ampullen zu 5 ml

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6402804.00.00