

Gebrauchsinformation

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe
www.dhu.de



Lachesis D8 ad us. vet.

Flüssige Verdünnung zur Injektion für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Homöopathisches Arzneimittel für Tiere

Zusammensetzung

1 Ampulle zu 5 ml enthält:

Wirkstoff: Lachesis Dil. D8 5 ml (isotonisch).

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Vor der Anwendung wird eine tierärztliche Untersuchung empfohlen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen kann es zur homöopathischen Erstreaktion kommen, was mit der zeitweisen Verschlimmerung von Symptomen einhergeht. Diese Erscheinung ist unbedenklich und bedeutet in der Regel keine Verschlimmerung des Krankheitsverlaufes.

Im Zweifelsfall ist der behandelnde Tierarzt zu konsultieren.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Zieltierarten

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Hunde, Katzen

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die Lösung ist subkutan zu injizieren.

Dosierung, soweit vom Tierarzt nicht anders verordnet:

Katze:	0,5 – 1 ml
Hund:	1 – 2 ml
Schaf/Ziege:	2 – 3 ml
Schwein:	5 ml
Pferd/Rind:	8 – 10 ml

Die angegebene Dosis sollte einmal täglich appliziert werden. Als Anfangsbehandlung bei perakuten Erkrankungen kann die Dosis auch mehrmals täglich injiziert werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne tierärztlichen Rat nicht über längere Zeit verabreicht werden.

Hinweise für die richtige Anwendung

Subkutane Injektionen sollten von Tierhaltern erst nach entsprechender fachlicher Unterweisung durch den Tierarzt vorgenommen werden.

Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum von ca. 30 Minuten zu beobachten, um bei Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sofort den Tierarzt verständigen zu können.

Wartezeit

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Tage

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden!

Nicht über 25 °C lagern.

Nach Anbruch sofort verbrauchen. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anzuwenden.

Besondere Warnhinweise

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden.

Anwendung während der Trächtigkeit und der Laktation

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Datum der Fassung der Packungsbeilage

Januar 2010

Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 20 (2x10) Ampullen zu 5 ml.

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 400424.00.00